

Biodiversitätsflächen in Wienerherberg







Jägerschaft hat in
Zusammenarbeit mit den
Landwirten in der
gesamten Flur
Biodiversitätsflächen
angelegt



streifenförmige DIV-Flächen



flächige DIV-Flächen





Luzerne



Hornklee

Weißklee

Rotklee

Inkarnatklee


erwartbares Verhalten in Mischungen

Luzerne, Weißklee: beständig in Mischungen

Rotklee: kurzlebig, ab 2. Standjahr stark rückläufig

Inkarnatklee: überjährlig, ab 2. Standjahr stark rückläufig

Hornklee: im Dauergrünland beständig bei extensiver Nutzung



29.8.2014



7.9.2014



18.9.2014




18.10.2014



9.5.2015

Anbau von 5 Kleearten im August 2014

18.5.2015



Hintaus

Kappenbühel – eine Teilfläche wurde nicht gemäht, um die Entwicklung beurteilen zu können



17.7.2015



17.7.2015



Kappenbühel

21.8.2015

14.8.2015 — Klee gemulcht, da kein ordentlicher zweiter Aufwuchs wegen Trockenheit

10.10.2015 — Klee wieder angewachsen





Biodiversitätsfläche

17.7.2015



22.8.2015

15.9.2015

3.10.2015



15.4.2016



14.5.2016





17.7.2015

Biodiversitätsflächen



22.8.2015



17.7.2015

Biodiversitätsfläche

22.8.2015



15.9.2015





10.10.2015



31.10.2015





28.11.2015



5.4.2016

14.5.2016





Juli 2015

14.5.2016



Diptam

