Anforderungen an einen Biodiversitätsindex für die Kulturlandschaft und dafür erforderliche Grundlagen

21. September 2021 | Netzwerk Zukunftsraum Land LE 14-20 | Florian Danzinger

Netzwerk Zukunftsraum Land wird finanziert von Bund, Ländern und Europäischer Union

Landschaft

- Landschaft als „**Mosaik interagierender Ökosysteme**“ das von Beziehungen und Prozessen zwischen den räumlichen Einheiten einer Landschaft, den Landschaftselementen geprägt wird (Forman & Godron, 1986)
- „**Landschaftsökosystem**“ als ein **hochkomplexes Wirkungsgefüge** aus physiogenen, biotischen und anthropogenen Faktoren (Leser, 1991)
- Landschaftstypen sind dabei wesentliche **Bezugs- und Bilanzräume**, die eine vergleichbare Bewertung erst ermöglichen
- **Mensch** nimmt **als gestaltende Kraft** eine wichtige Rolle ein und hat neben den biotischen und physiogenen Kräften (Klima, Relief, ...), wesentlich in die Gestaltung und Werden der mitteleuropäischen Landschaft eingegriffen

Kulturlandschaft

- mitteleuropäische Landschaft ist **größtenteils das Werk des Menschen**
- nur dort wo der menschliche Einfluss zurücktritt, ist der **Charakter der Naturlandschaft** erhalten geblieben
- **Störungsregime**, sowie die Stoff- und Energieflüsse werden hauptsächlich **durch den Menschen kontrolliert** und gesteuert (Nassauer, 1995)
- **Kontrolle** dabei **durch Bewirtschaftungspraktiken** auf Feldern, Wiesen und Wäldern, sowie durch **Steuerung** der Landbewirtschaftung
- **Bewirtschaftungsentscheidungen** werden entsprechend der lokalen **agro-ökologischen Charakteristika** getroffen, die sozialen, ökonomischen und technischen Rahmenbedingungen unterliegen

Kulturlandschaftsgliederung Österreichs

Kartenautoren: Th. Wrbka, Schmitzberger, M. Pühringer,
K. Fussenegger & E. Szerecsits
Kartographie: H. Beissmann, R. Hengsberger & G. Tutsch
Kartenprojektion: analog zur Österreichischen Karte 1:500.000
Wien, im Jänner 2000
© Kulturlandschaftsgliederung Österreichs (Leitung: Th. Wrbka)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 km

Gliederung der Kulturlandschaften Österreichs in Typengruppen

Visuelle Interpretation von Satellitenbildern und Abgrenzung der Typenreihen und -gruppen auf Basis des Landnutzungsmusters österreichischer Kulturlandschaften. Abgrenzungskriterien waren Landnutzungsclassen, Landschaftsstruktur und Reliefmerkmale. Neben Landnutz. TM 5 (1993-1995) wurde auch topographische Information herangezogen.

Das Projekt "Kulturlandschaftsgliederung Österreichs" wurde im Rahmen der Kulturlandschaftsforschung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr durchgeführt.

Kartenautoren: Th. Wrbka, Schmitzberger, M. Pühringer,
K. Fussenegger & E. Szecsenyi
Kartographie: H. Betsmann, R. Hengsberger & G. Tutsch
Kartographie: analog zur Österreichischen Karte 1:500.000
Wien, im Jänner 2009
© Kulturlandschaftsgliederung Österreichs (Leitung: Th. Wrbka)

Kulturlandschaftstypenreihen und -gruppen

	A Alpine Fels- und Eisregionen
101	Fels- und Eisgelände alpiner und subalpiner Hochlagen
	B Subalpine und alpine Landschaften mit großräumigem Weide- und Naturgrünland
102	Naturgrünland und Extensivweideland alpiner und subalpiner Hochlagen
103	Intensivweideland alpiner und subalpiner Hochlagen
	C Bandförmig ausgedehnte Waldlandschaften
201	Walddominierte Talflanken der Alpen
203	Auwaldbänder entlang großer Flüsse
204	Walddominierte Schluchten und Engtäler
	D Inselförmige Waldlandschaften
202	Große außeralpine Waldinseln
205	Walddominierte Mittelgebirge
	E Grünlandgeprägte Kulturlandschaften des Berglandes
301	Grünlanddominierte inneralpine Rodungsinseln und -bänder
302	Grünlanddominierte alpine Engtäler
303	Grünlanddominierte randalpine Rodungsinseln und -bänder
308	Grünlanddominiertes außeralpines Bergland
	F Grünlanddominierte Kulturlandschaften glazial geformter Becken, Talböden und Hügelländer
304	Grünlanddominierte rand- und inneralpine Seebecken und Eiszerfallslandschaften
305	Grünlanddominierte inneralpine Becken und breite Talböden
310	Grünlanddominiertes außeralpines Hügelland
	G Grünlandgeprägte Kulturlandschaften der außeralpinen Hügelländer, Becken und Täler
306	Grünlandgeprägte außeralpine Einbruch- und Seebecken
307	Grünlandgeprägte außeralpine Täler und Mulden
311	Großräumige außeralpine Trockenrasen- und Hutweidelandschaften
312	Illyrische Grünland-, Obstbau-, Futterbau-Komplexe
313	Grünlandgeprägte außeralpine Engtäler
309	Großräumige Brache- und Sukzessionsflächen
	H Kulturlandschaften mit ausgeprägtem Feldfutterbau oder gemischter Acker-Grünlandnutzung
401	Inneralpine Talböden und Becken mit gemischter Acker-Grünlandnutzung
402	Außeralpines Hügelland mit gemischter Acker-Grünlandnutzung und ausgeprägtem Feldfutterbau
406	Rand- und voralpine Rodungsinseln mit ausgeprägtem Feldfutterbau
407	Randalpine Rodungsinseln mit gemischter Acker-Grünlandnutzung
409	Futterbaugeprägte Seebecken
410	Futterbaudominierte inneralpine Talböden und Becken
411	Futterbaudominierte außeralpine Talböden und Becken
	I Kulturlandschaften mit dominantem Getreidebau
403	Außeralpines Hügelland mit dominantem Getreidebau
404	Außeralpine Becken und Talböden mit dominantem Getreidebau
405	Ackerbaugeprägte außeralpine Rodungsinseln
408	Ackerbaugeprägtes außeralpines Bergland
	J Weinbaudominierte Kulturlandschaften
601	Weinbaudominierte ebene Lagen und Flachhänge
602	Weinbaudominierte steilere Hangzonen
	K Kulturlandschaften mit kleinteiligen Weinbau- und Obstbaukomplexen
603	Pannonische Ackerbau-, Weinbau-Komplexe
604	Illyrische Obstbau-, Weinbau-, Futterbau-Komplexe
	L Siedlungs- und Industrielandschaften
701	Groß- bis mittelstädtischer Verdichtungsraum
702	Verdichtungsgebiet entlang überregionaler Verkehrsachsen
703	Historisch gewachsene Industrie- und Siedlungslandschaft
704	Junge Industrie- und Siedlungslandschaft
705	Kleinstädtischer und suburbaner Siedlungsraum
706	Großräumige Tagbaue und Deponien

Räumliche Dimensionen der Landschaft

- Landschaftselement als die kleinste abgrenzbare, homogene ökologische Raumeinheit
- Landschaftselemente sind die Bausteine auf der Ebene der Landschaft (Forman 1995)
- Landschaften als ein **spezifisches Gefüge** von Landschaftselementen, die ein sich in ähnlicher Weise **wiederholendes räumliches und zeitliches Muster** bilden (Niemann 1982; Krönert 1999; Forman & Godron 1986)

Bild: Thomas Wrбка

Bild: Universität Wien

Bild: Ralph Rayner

Bild: Naturwissenschaftliche Universität Breslau

Zeitliche Dimensionen der Landschaft

- Prozesse in der Landschaft nicht nur in einem räumlichen, sondern auch in einem zeitlichen Rahmen
- Durch **periodische oder chronische Störung** werden Lebensräume geschaffen und verschwinden wieder (Störungs- und Sukzessionsereignisse)
- **jahreszeitliche Abläufe** der landschaftlichen Veränderungen
- **Landnutzungsweisen** der Agrarlandschaft wirken sowohl im räumlichen, als auch im zeitlichen Kontext
- **Fruchtfolge** oder unterschiedliche **Bewirtschaftungszeitpunkte** in benachbarten Flurstücken schaffen ein **räumlich und zeitlich heterogenes Muster**

Biodiversität in der Kulturlandschaft

- Die Artenvielfalt wird von folgenden Faktoren bestimmt (Sauberer, Moser & Grabherr 2008):
 - **Klima** (Temperatur, Niederschlag)
 - **Landschaftsstruktur** (Ökotonlänge, Habitatvielfalt etc.)
 - **Landnutzungsintensität** (Anteil naturnaher Lebensräume etc.)

“Hot-spots” entlang von Grenzzonen (Ökotonen)

Landschaftsstruktur

- Räumliche Heterogenität in einer Landschaft
 - durch ungleichmäßige **Verteilung von Ressourcen** im Raum (Substratheterogenität: Wasser, Nährstoffe, Licht, Lebensraum, ...)
 - **natürliche Störungen** („natural disturbance“: Feuer, Stürme, Krankheiten, Schädlingskalamitäten, Überflutungen, ...)
 - durch **anthropogene Aktivität** (sozio-kulturelle Sphäre)
- Räumliche Heterogenität in Kulturlandschaften
 - als **Mosaik**, bei dem die Objekte der Landschaft mehr oder weniger **deutlich gegeneinander abgegrenzt** sind, so dass man lineare und kleinflächige Muster unterscheiden kann

Landschaftsstruktur

- jedes Element der Landschaft kann einerseits in die **strukturell-funktionellen Grobkategorien** eingeteilt werden („Matrix-Patch-Korridor“)

Bild: Thomas Wrbka

Landschaftsstruktur

- jedes Element der Landschaft kann einerseits in die **strukturell-funktionellen Grobkategorien** eingeteilt werden („Matrix-Patch-Korridor“)
- andererseits in die Kategorien der **Entstehungsmechanismen** („disturbance – remnant – regeneration – environmental resource – introduced“)

Bild: Margit Gross

Bild: Thomas Wrbka

Landschaftsstruktur

- Betrachtung des **gesamten Komplexes** der Landschaftselemente/des Landschaftsmosaiks zum **Verständnis** von Funktionen und Entwicklungsmöglichkeiten von Landschaften
- **Prozesse der Landschaft** werden nicht nur über die stofflichen Eigenschaften und vertikalen Zusammenhänge, sondern auch durch **räumliche Muster** gesteuert
- **Menschliche Aktivität** tendiert dazu **räumlich klar abgegrenzte Muster** zu erzeugen, wogegen sich in natürlichen Systemen sowohl **scharfe als auch unscharfe Grenzen** finden lassen

Hemerobie bzw. Naturnähe / Naturferne

- Veränderungen in der **landschaftlichen Konfiguration** schlagen sich in der biotischen Vielfalt einer Landschaft nieder
 - Änderungen in der **Ausstattung mit Kleinstrukturen** oder
 - **Konfiguration und Größe** von Ackerschlägen
- Hemerobie auch ein wichtiger **Indikator für die biotische Vielfalt** der Kulturlandschaft
- **Landschaftsstruktur** dabei wichtige Rolle als indirekter **Indikator um Hemerobie zu messen**
 - auf Landschaftselementebene, Landschaftsebene und regionaler Ebene einsetzbar

Hemerobie bzw. Naturnähe / Naturferne

- Maß für den **menschlichen Kultureinfluss** auf Ökosysteme
- „potentiell natürliche Vegetation (PNV)“ als Vergleichsgröße
- Parameter sind beispielweise (siehe Bastian & Schreiber 1999):
 - Natürlichkeit der Vegetation
 - Potential der natürlichen Regeneration
 - Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmittel
 - Ausmaß und Stärke des Bodenumbrochs
 - Grad der Bodenverdichtung
 - Neophytenanteil
- konsistenten Bewertungsansatz für sehr unterschiedliche Landschaften

Grad der menschlichen Beeinflussung

■ metahemerob	übermäßig stark und einseitig kulturbeeinflusst
■ polyhemerob	sehr stark kulturbeeinflusst
■ α-euhemerob	stark kulturbeeinflusst
■ β-euhemerob	stark kulturbeeinflusst
■ mesohemerob	mäßig kulturbeeinflusst
■ oligohemerob	schwach kulturbeeinflusst
■ ahemerob	nicht kulturbeeinflusst

Hemerobie

Annatsberg
Hemerobie

Wrbka, T., Peterseil, J., Kiss, A., Schmitzberger, I., Plutzer, C., Szerencsits, E., ... & Tutsch, G. (2003). Landschaftsökologische Strukturmerkmale als Indikatoren der Nachhaltigkeit (Spatial Indicators for Land Use Sustainability). Projekt im Rahmen des Leitschwerpunktes Kulturlandschaftsforschung, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Schwendetobel
Hemerobie

Anderlalm
Hemerobie

Jois
Hemerobie

Grad der menschlichen Beeinflussung

	metahemerob	übermäßig stark und einseitig kulturbeeinflusst
	polyhemerob	sehr stark kulturbeeinflusst
	α-euhemerob	stark kulturbeeinflusst
	β-euhemerob	stark kulturbeeinflusst
	mesohemerob	mäßig kulturbeeinflusst
	oligohemerob	schwach kulturbeeinflusst
	ahemerob	nicht kulturbeeinflusst

Hemerobie bzw. Naturnähe / Naturferne

Hemerobie österreichischer Kulturlandschaften

Darstellung der durchschnittlichen Hemerobie der Typengruppen der österreichischen Kulturlandschaften auf Basis einer expertengestützten Bewertung.

Das Projekt "Landschaftsökologische Strukturmerkmale als Indikatoren der Nachhaltigkeit (SINUS)" wurde im Rahmen der Kulturlandschaftsforschung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur durchgeführt.

Kartenautoren: Th. Wrbka, E. Szerencsits, K. Reiter & J. Peterseil
 Kartographie: H. Beissmann, R. Hengsberger & G. Tutsch
 Kartenprojektion: analog zur Österreichischen Karte 1:500.000
 Wien, im Dezember 2002
 © SINUS (Leitung: Th. Wrbka)

0 10 20 30 40 50 km

Wrbka, T., Peterseil, J., Kiss, A., Schmitzberger, I., Plutzer, C., Szerencsits, E., ... & Tutsch, G. (2003). Landschaftsökologische Strukturmerkmale als Indikatoren der Nachhaltigkeit (Spatial Indicators for Land Use Sustainability). Projekt im Rahmen des Leitschwerpunktes Kulturlandschaftsforschung, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Jois Hemerobie

Grad der menschlichen Beeinflussung

metahemerob	übermäßig stark und einseitig kulturbeeinflusst
polyhemerob	sehr stark kulturbeeinflusst
α-euhemerob	stark kulturbeeinflusst
β-euhemerob	stark kulturbeeinflusst
mesohemerob	mäßig kulturbeeinflusst
oligohemerob	schwach kulturbeeinflusst
ahemerob	nicht kulturbeeinflusst

Landschaftsstruktur

- Kartierbar

Landschaftsstruktur

- Kartierbar
- Messbar

Theme: **RESOURCE LANDUNITS**

Quadrant: **WINTEN**

Federal coord.: **758/219**

Landscape type 1.: Hill slope
dominated by small vineyards

Landscape type 2.: Valley bottom
with intensively used arable land

ENVIRONMENTAL RESOURCES - WATER

Theme: **DISTURBANCE LANDUNITS**

Quadrant: **ST. Georg en im Gailtal**

F Coord.: **470162**

Topog. Map Nr. **200**

ANTHROPOGENIC DISTURBANCE

Artenreichtum korreliert mit räumlicher Ausdehnung

Bilder: Thomas Wrбка

Artenreichtum korreliert mit Struktur

Artenzahl korreliert mit Böschungsprofil

Bilder: Johannes Maurer, Frank Gottwald

Landschaftsstruktur korreliert mit Naturnähe

- Monofunktionale, intensive Landnutzung erzeugt einfache Landschaften mit geringer Naturnähe

(a) Zusammenhang von Landnutzung und Landschaftskomplexität – intensiv genutzte Acker- und Weinbauflächen (links) und extensive, natürliche Salzstandorte (rechts)

(b) Streudiagramm der Landnutzungsintensität (Hemerobie) und Landschaftskomplexität (NSCP) ($r^2=0,51$, $p<0,01$)

Rettet die Natur; zitiert in: Umwelt in der Schweiz, 1997

Naturnähe korreliert mit Artenreichtum

Quelle: Sauberer et al. 2008

Indikator „High Nature Value Farmland“ (HNVF)

Indikatorsystem für landwirtschaftliche Flächen mit hohem Naturwert der gemeinsamen Agrarpolitik

High Nature Value Farmland – Was ist das?

- Indikatorsystem zur Beschreibung
 - der **aktuellen Verbreitung** von **nutzungsgebundenen wertvollen Biototypen**
 - der **aktuellen Nutzung** auf diesen Flächen
- 1 von 35 **EU-Indikatoren** zur Integration von Umweltbelangen in die gemeinsame Agrarpolitik (CAP)
- 1 von 3 **Biodiversitäts-Indikator** innerhalb Schwerpunkt „Verbesserung der Umwelt und der Landschaft“ (ELER VO Nr. 1974/2006/EG, Anhang VIII)

Types of High Nature Value Farmland:

Images: HNV-Link (top and center) and Bernd JanStijf CC BY-SA 3.0 (bottom)

Drei verschiedene Typen von HNVF-Systemen
(verändert nach HNV-Link, Andersen et al. 2004)

High Nature Value Farmland – Umsetzung in Österreich

- Weiterentwicklung des Agrar-Umweltindikators HN VF für Österreich (Umweltbundesamt 2011)
- Ziel: nur landwirtschaftliche Flächen in Gebietsabgrenzung mit einzubinden, die entsprechende **Biotoptypen enthalten** oder zumindest mit **hoher Wahrscheinlichkeit enthalten** können
- Indikator HN VF soll **landwirtschaftliche Flächen** erfassen, die durch **großen Artenreichtum** bzw. durch das **Vorkommen von Arten mit hohem Schutzinteresse** charakterisiert sind
 - Beurteilung der Auswirkungen der Maßnahmen des Agrarumweltprogramms auf die Biodiversität

Drei verschiedene Typen von HN VF-Systemen
(verändert nach HN VF-Link, Andersen et al. 2004)

High Nature Value Farmland – Umsetzung in Österreich

- **Typ 1:** naturnahe landwirtschaftliche Flächen, durch hohe biologische Vielfalt gekennzeichnet und durch extensive landwirtschaftliche Nutzungsformen produziert (**Nutzungsbedingte HN VF-Fläche**)
 - Erfassung durch Daten zur Nutzung und Betriebsinformationen (INVEKOS, ÖPUL Maßnahmen)
- **Typ 2:** charakterisiert einen auf Landschaftsebene übergeordneten Typ von landwirtschaftlichen Systemen mit hohem Strukturreichtum (**Strukturbedingte HN VF-Fläche**)
 - Identifizierung solcher Gebiete auf Landschaftsebene (1 km² INSPIRE-Raster)
 - Strukturwert jeder Raumeinheit aus Anzahl der verschiedenen Kulturarten und Schläge

High Nature Value Farmland – Umsetzung in Österreich

High Nature Value Farmland in Österreich 2007

High Nature Value Farmland in Österreich 2007

High Nature Value Farmland in Österreich 2013

Weiterentwicklung des Agrar-Umweltindicators HNVP für Österreich (Umweltbundesamt 2011)

High Nature Value Farmland – Umsetzung in Österreich

- **Typ 1:** naturnahe landwirtschaftliche Flächen, durch hohe biologische Vielfalt gekennzeichnet und durch extensive landwirtschaftliche Nutzungsformen produziert (Nutzungsbedingte HN VF-Fläche)
- **Typ 2:** charakterisiert einen auf Landschaftsebene übergeordneten Typ von landwirtschaftlichen Systemen mit hohem Strukturreichtum (Strukturbedingte HN VF-Fläche)
- **Typ 3:** charakterisiert landwirtschaftlich genutzte Flächen, die wichtige Lebensräume für Arten von regionalem, nationalem und/oder gemeinschaftlichem Schutzinteresse darstellen

Bilder: Grosstrappe.at

Types of High Nature Value Farmland:

Images: HN VF-Link (top and center) and Bernd Janssi (CC BY-SA 3.0) (bottom)

Drei verschiedene Typen von HN VF-Systemen (verändert nach HN VF-Link, Andersen et al. 2004)

Vergleich des HNVF mit relevanten Studien

- Orchideen als Zeiger für Biodiversität (Kriechbaum et al. 2007)
 - Offenland-Orchideen zeigen starke Abhängigkeit zu Bewirtschaftungsformen
 - Indikatoren für die Nachhaltigkeit der Nutzung von Grünlandökosystemen
- Bericht gemäß Art. 17 FFH-Richtlinie
 - Regelmäßiges, verpflichtendes Monitoring über Zustand der FFH-Lebensraumtypen und Arten
 - 15 FFH-Lebensraumtypen, die auf landwirtschaftliche Nutzung angewiesen sind
- BINATS - Biodiversität in österreichischen Ackerbaugebieten (Pascher et al. 2007 & 2017)
 - Untersuchung des Status der Vielfalt von Arten und Lebensräumen sowie deren quantitative und qualitative Veränderung und aktuelle Trends anhand der fünf Indikatoren Habitate, Gefäßpflanzen, Heuschrecken, Tagfalter und Wildbienen

Landschaftsstruktur als Indikator für (nicht) nachhaltige Landnutzung ?

- Der Einfluss des Menschen verändert den landschaftlichen Haushalt zu seinen Gunsten
→ **Transformation**
- Das natürlich bedingte Produktionspotential wird durch Energie- und Stoffeinsatz gesteigert
→ **Intensivierung**
- Dies führt zu einer Vereinfachung der Geometrie der Landschaft (Odum & Turner 1990, Forman & Godron 1986)
→ **Homogenisierung**
- Veränderungen in der landschaftlichen Ausstattung wirken negativ auf die biotische Vielfalt einer Landschaft (Moser et al. 2002)
→ **Fragmentierung, Versiegelung**

naturnahe Landschaft

intensive Agrarlandschaft

zunehmender menschlicher Einfluss

Artenreiche Kulturlandschaften - was ist zu tun?

- Schutzgebietsnetzwerk muss weiter verdichtet werden
- Restoration übernutzter Landschaften und geschädigter Ökosysteme dringend nötig
- Grüne Infrastruktur muss überregional geplant und zügig ausgebaut werden
- Agrar-Umweltförderung sollte zielgenauer und leistungsorientiert sein

→ Entwicklung eines Biodiversitätsindex für agrarisch genutzte Kulturlandschaften

Landschaftsstruktur als Indikator für (nicht) nachhaltige Landnutzung ?

- Mehrdimensionale Betrachtung von Landschaft und der „Wirkung“ von Landschaftselementen
 - Was ist es? Lebensraumtyp und Qualität (Hemerobie, Struktur, ...)
 - Wie ist es entstanden? Entstehungs- und damit Erhaltungsmechanismen
 - Wo liegt es? Räumliche Verteilung und Einbindung

- Ohne räumliche Betrachtung der Qualität von Landschaft kein umfassender Biodiversitätsindex möglich

Florian Danzinger

Universität Wien
Department für Botanik und Biodiversitätsforschung
Abteilung für Naturschutz, Vegetations- und Landschaftsökologie

<http://cvl.univie.ac.at>

florian.danzinger@univie.ac.at

[facebook.com/UniversityofViennaCVL](https://www.facebook.com/UniversityofViennaCVL)